



الدليل البسيط
للأدوية النفسية

SIMPLE GUIDE
TO PSYCHIATRIC MEDICATIONS



المراكز الفلسطينية للإرشاد

The Palestinian Counseling Center



مقدمة

يرى كثير من الباحثين أن الإرشاد النفسي والطب النفسي وجهان لعملة واحدة، ومكملان بعضهما البعض، فكلاهما يهدف إلى مساعدة المتنفع/ة للوصول إلى تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية. يتركز الفرق بينهما في أن الطبيب/ة النفسي يتميز في معرفته الطبية مما توكل إليه مهمة التشخيص ووصف العلاج الدوائي المناسب، أما المرشد/ة النفسي فيعمل على زيادة فهم ووعي المتنفع/ة لمشكلاته ومساعدته على إيجاد الطريقة المناسبة لحلها، ومتابعة المتنفع/ة من حيث التزامه بالوصفة الطبية الموصى بها من قبل الطبيب النفسي.

من هنا تأتي أهمية معرفة المرشد النفسي بطبيعة الأدوية التي تعطى لهؤلاء المتنفعين/ات الذين/اللواتي يعانون من أمراض نفسية، فالمرشد/ة قد يرى المتنفع/ة بشكل أكبر من المعالج، ويراقب الفاعلات التي تحدث مع المتنفع/ة، وقد يجب على بعض تساؤلات المتنفع/ة حول الجرعات الدوائية.

هنا تكمن أهمية عمل هذا الكتيب الذي يعتبر دليل بسيط للمرشدين والأخصائيين النفسيين العاملين في حقل الإرشاد النفسي، حيث أنه يوفر لهم قاعدة معلوماتية طيبة حول هذه الأدوية، الجرعة الدوائية لها والشكل الصيدلاني المتواجد عليه.

سيتضمن هذا الكتيب أيضاً معلومات عن عدد من الأدوية التي لها علاقة بالعديد من الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان وتؤثر على عمل جهازه العصبي.

ومجموعة الأدوية التي سيتم إيرادها في الكتيب مع الشرح هي:

١. أدوية لعلاج الأمراض الذهانية.
٢. أدوية لعلاج أمراض المزاج/العاطفة.
٣. أدوية لعلاج الخوف (مهدئات ومنومات).
٤. أدوية لعلاج العوارض الجانبية.



المركز الفلسطيني للارشاد

The Palestinian Counseling Center

هاتف : ٠٢/٦٥٦٢٢٧٢ - ٠٢/٢٩٨٩٧٨٨

E-mail:pcc@palnet.com

Web:www.pcc-jer.org



أنواع الأدوية

١- أدوية علاج الأمراض الذهنية (Antipsychotic)

الفئة الأولى: الأدوية القديمة (الجيل الأول)

وهي تعمل على طريقة Dopamine 2 Inhibition وتضم: Halidol : ويكون على شكل سائل، حقنة كل شهر، وحبوب. Modecate : ويكون على شكل سائل، حقنة كل شهر، وحبوب. Semap : جبة مرة واحدة كل أسبوعين Clopexol : على شكل سائل، حقنة كل ٣-٢ أسابيع وحبوب. Stelazine : حتى ٤٠ ملغم يومياً. Melleril : حتى ٣٠٠ ملغم يومياً. (تناول جرعة ملحة طويلة وبكميات كبيرة تؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور بقع بنية اللون في العين، ومن الممكن أن تؤدي إلى إصابة ضعف في النظر). Tarocetyl : حتى ١٢٠٠ ملغم يومياً (يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم الخروج للشمس لكي لا يتسبب بحرق للمريض). Perphinan : حتى ٦٤ ملغم يومياً Nozinan : حتى ٣٠٠ ملغم يومياً.

هناك أعراض جانبية شديدة لهذه الفئة مثل:

- Dystonia

وهي التصلب في عضلات الأرجل، الرقبة، اليدين والعينين، أي تكون حركة اليدين مثل حركة العجلات المسننة (Cogwheel).

ما قبل البدء بالعلاج

من الضروري قبل البدء بأي علاج نفسي دوائي الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

١. إجراء فحوصات دم شاملة أو فحوصات أخرى لكي تكون المرجع الأساسي لأي تغيير يحدثه العلاج في المستقبل.
٢. الأمراض والأدوية التي يتعاطاها المريض من قبل، لأن بعض الأمراض قد تتعاظم. فعلى سبيل المثال في حالة تعاطي أل - Comadine مع Seroxat يؤدي إلى ارتفاع نسبة Comadine في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع مدة تخثر الدم، والأخطر من ذلك هو النزيف الذي لا يتوقف.
٣. التشخيص الجيد للمريض وتحديد الهدف من إعطائه الأدوية.
٤. التاريخ المرضي للمريض (هل استعمل هذا الدواء من قبل؟ ماذا كان تأثيره على المريض؟) وبناءً عليه يعطي الدواء نفسه أو دواء آخر من نفس العائلة.
٥. هل حاول المريض في الماضي الانتحار بالأدوية. إذا كان الجواب نعم فعلى الطبيب إعطاء المريض كمية أقل من الأدوية أسبوعياً، و اختيار الأدوية الأقل خطورة في حالة محاولة انتحار جديدة.
٦. التعرف على الأعراض الجانبية جراءأخذ الأدوية في الماضي.
٧. عمر المريض: بحيث يجب أن تكون الجرعة للأطفال والشيوخ أقل من الطبيعي، وكذلك الأمر للأشخاص الذين يأخذون هذا النوع من الدواء لأول مرة.
٨. الحمل والرضاعة، بعض الأدوية تكون مضرة جداً في الأسابيع الأولى من الحمل، وفي فترة الرضاعة حيث من الممكن أن ينتقل الدواء إلى الطفل من خلال حليب الأم، لذلك من المجد إيقاف الرضاعة، وتقليل جرعة الدواء في حالة الحمل مع المتابعة المستمرة للجنين.
٩. تغيير الدواء فقط بعد أخذ المريض الجرعة العلاجية ولمدة لا تقل عن شهر.
١٠. في حالة ظهور عوارض جانبية خطيرة من أية دواء يمنع العودة لهذا الدواء.



لكي تتجنب هذه الأعراض يجب بدء العلاج بكميات قليلة ورفعها تدريجياً مع ملائمة الدواء للمريض، وعند ظهور هذه الأعراض يجب معالجتها بأدوية مضادة لها، أو بتقليل الجرعة أو تغييرها لأدوية ذات عوارض جانبية أقل، وفي الحالات الخطيرة مثل (NMS) يجب إيقافها فوراً.

الفئة الثانية: Atypical

وهي الفئة التي تعمل على Serotonin Dopamine Antagonist مثل :

- Respridal
- Leponex
- Zyprexa serquil

الأعراض الجانبية لهذه الأدوية أقل من الفئة الأولى إلا أنها تسبب ارتفاع بالوزن. كذلك فإن استخدام بعض هذه الأدوية يسبب إفراز لعاب كثير يؤدي إلى التهابات في الرئة، لذلك يجب إجراء فحوصات دم قبل البدء باستخدامه، وإجراء تحظيط للقلب لأنّه يسبب أيضاً التهاب في غشاء القلب (Pericarditis).

كذلك فإن استخدام Leponex يسبب هبوط كريات الدم البيضاء لذلك يتوجب فحص كريات الدم البيضاء مرة واحدة كل أسبوع (CBC + DIF) وفي حالة هبوط عددها عن ٣٠٠٠ يجب إيقاف العلاج فوراً، إرسال المريض إلى المستشفى، وينبغي الرجوع لاستخدام هذا الدواء.

- **Dysphagia** وهي الشعور بتصلب في عضلات الرقبة مما يؤدي لعدم القدرة على بلع الطعام بما فيها السوائل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث شرقة ودخول المواد إلى الرئتين.
- **Akatizia** وهي عدم المقدرة على الجلوس في مكان واحد، وفي حالة الجلوس أو الاستلقاء يستمر المريض بتحريك قدميه على شكل المشي.
- **Sedation** خمول وهي من الشكاوى الأولى عند المريض.
- **Parkinsonism** وهي تصلب في العضلات مما يؤدي لجمود بالظاهر الخارجي، بطء الحركة، وارتجاج الأطراف.

- **Tardive Dyskinesia** وهي عبارة عن حركات لا إرادية في منطقة الفم.
- **Epilepsy** عوارض صرع.
- **Neuroleptic malignant send (NMS)** وهو أخطر العوارض الجانبية ويتضمن حرارة عالية، تصلب الجسم، تعرق، ضغط دم غير متزن، دقات قلب سريعة، عدم المقدرة على الكلام، وتوتر عالي.

ومن خلال فحص الدم يظهر ارتفاع في عدد كريات الدم البيضاء، ارتفاع في الأنزيمات وخاصة أنزيمات الكبد والكلى، ومن الممكن أن يؤدي عدم التشخيص المبكر إلى موت المريض .

- **Prolactine** ارتفاع في هرمون الحليب مما يؤدي إلى مشاكل في الدورة الشهرية.
- انخفاض في الشهوة الجنسية والانتصاب لدى الرجال .



لذلك لا تستخدم هذه الأدوية في يومنا هذا وبدلاً منها يستخدم RMOIS الذي لا يؤدي إلى هذه العوارض الجانبية إلا أنه يؤدي إلى: هبوط في ضغط الدم عند الوقف ، عدم القدرة على النوم ، ارتفاع الوزن ، انتفاخ (Edema) ، وهبوط في الرغبة الجنسية

٢- أدوية ضد اضطرابات المزاج / عاطفية

تقسم الأدوية المستخدمة لاضطرابات المزاج الاكتئابية والهوسية لثلاثة أنواع بالإضافة للخدمات الكهربائية :

٢- الأدوية الجديدة مثل:

SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) (Cipramil, Lustral, Proamitine seroxat)

تؤخذ هذه الأدوية صباحاً أو مساءً بجرعات قليلة ، ومن ثم يتم رفعها تدريجياً حتى وصول الجرعة الملائمة .

الأعراض الجانبية لهذه الفئة أقل بكثير من سابقيها ، وتمثل أغلب الأحيان في : حموضة في المعدة (لذلك يجب إعطائها بعد الوجبات) ، إسهال ، ألم في الرأس ، عطس في الأداء الجنسي ، تشنجات وفي بعض الأحيان ارتفاع في هرمون الحليب . Prolactin

عند إيقاف هذا العلاج بشكل فجائي تظهر أعراض تسمى: Serotonin and Withdrawal Syndrome وتتضمن: إرهاق ، غثيان ، ألم في الرأس ، عودة للأكتئاب ، وشعور بعدم القدرة على التنفس . ويمكن تجنب هذه الأعراض بتوقف الجرعات الدوائية بشكل تدريجي .

NSRI (Noradrinaline Serotonin Reuptake Inhibitor)
مثل: Effexor, Cipralex
في القلب وضغط الدم وذلك بسبب Nor Epinephrine .

- ١ . الأدوية القديمة (Tricyclic Drugs, MAO (Monoamine Oxidase Inhibitor)
- ٢ . الأدوية الجديدة (RMOI, SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibition)

- ٣ . الصدمة الكهربائية ECT (Prophylactic)
- ٤ . أدوية (Prophylactic)

١. الأدوية القديمة مثل:

(Favoxil, Elatrol, Tofranil, Anafranil)
وهي تعمل أكثر بطريقة Antimuscarinic & Anticholinergic لذا تسبب أعراض جانبية أكثر شدة من الأدوية الأخرى تمثل في: الإرهاق ، ألم في الرأس ، هبوط في ضغط الدم ، مشاكل في دقات القلب (Anafranil, Tofranil) ، إمساك وحصري بول (Elatrol) ، رؤيا مشوشة ، جفاف بالفم ، جفاف في إفراز العرق مما يؤدي إلى تأثير أو سكب الحيوانات المنوية إلى الخلف ، ارتفاع درجة حرارة الجسم ، هذيان ، وانسداد في العين (Narrow Angle Glaucoma-Photophobia) .

في هذه الحالات أيضاً يجب إعطاء الأدوية مع الأخذ بالحسبان الأعراض الجانبية وتوافقها مع الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض .

أما MAO مثل Remeron Nardil, Phenelzine, Isocarboxazid فهي خطيرة جداً خاصة إذا أخذت مع أية مادة تحتوي Tyramine حيث تؤدي إلى ارتفاع حاد جداً في ضغط الدم ، وهذه المادة (Tyramine) موجودة في الأجبان ، الأسماك ، المشروبات الروحية وغيرها .



فعلى سبيل المثال قبل البدء بـ Lithium يجب إجراء الفحوصات التالية: الغدة الدرقية (T4-T3)، أنزيمات الكبد والكلى، السكر، كريات الدم البيضاء والحمراء، لأن العلاج بهذا النوع من الممكن أن يسبب: Hypothyroid، Hyperglycemia، Renal failure، رجفة بسيطة في الأطراف، كثرة تبول وجفاف بالفم، لذلك ينصح المريض بشرب الماء والتقليل من أكل الملح ومضغ العلقة.

كذلك يجب متابعة فحص تركيز الدواء بالدم وهو يتراوح بين ١٠-٥٪، وفي حالة التسمم يجب إيقاف الدواء وإرسال المريض للمستشفى.

أما Valporal، Tegretol فهما يستعملان لعلاج الصرع ولتشييت المزاج أيضاً، وعلى المريض أن يرBushنفس الفحوصات لأن Tegretol يضر في الكبد، ومن الممكن أن يتسبب بضرر للجنين عند الحوامل من خلال الإصابة بـ Spina-befida.

أما Valporal يضر في الكلى، يسبب زيادة في الوزن ويؤثر سلباً على تكوين كريات الدم البيضاء، لذلك يمنع أن يعطى مع Liponex، كذلك يمنع استعماله مع الذي يرفع عدد كريات الدم البيضاء، ومن الممكن أن يسبب هذيان Delirium. يجب متابعة الفحوصات مرة كل أسبوع أو أسبوعين خلال الثلاثة أشهر الأولى ثم يتم متابعتها مرة في الشهر.

٥ . مهدئات (أدوية للنوم ومضادة للخوف).

هذه لمجموعه تضم:

-1 Benzodiazepine هذه الأدوية معروفة للجميع، مثل: Valium، Lorevane، Clonex، Assival Vaben، Xanax,. تعاطي هذه الأدوية بشكل عشوائي أو بكميات كبيرة من الممكن أن يؤدي إلى الإدمان. الأدوية ذات فترة فعالية قصيرة مثل Clonex و Xanax سريعة الفعالية لكنها سريعة الإدمان أيضاً والقطام عنها صعب جداً، لذلك من المحبذ استعمال أدوية ذات فترة بقاء

٣- الصدمة الكهربائية (ECT)

وهي إحدى العلاجات التي يتم اللجوء إليها في حالة عدم التحسن بواسطة العلاج الدوائي، أو عندما يكون وضع المريض خطر جداً وبحاجة لرد فعل علاجي سريع. هذا العلاج يستعمل لعلاج الذهان (Psychosis) والأمراض العاطفية جمعها.

يتم هذا النوع من العلاج في وحدة العلاج للصدمات الكهربائية وتحت إشراف طبيب مخدر والطبيب المعالج. لا يتم العلاج إلا بعد موافقة طبيب العائلة، طبيب الأعصاب، إجراء جميع الفحوصات الالازمة، ومن ثم موافقة المريض والعائلة.

العلاج يتم بعد التخدير، وتقاس قوة العلاج بمدة التشنج بعد إدخال التيار الكهربائي والذي يقايس بوحدة JAUL، وعدد العلاجات يتحدد حسب حالة المريض.

الأعراض الجانبية لهذا النوع من العلاج هي أقل بكثير من علاج الأدوية وتمثل بـ:

- ١- النسيان المؤقت.
- ٢- تشنجات متأخرة بعد العلاج.
- ٣- ارتفاع درجة الحرارة بسبب المواد المخدرة أو بسبب التشنج.
- ٤- ألم في الرأس أحياناً.

Prophylactic - 4

أدوية لعلاج استقرار المزاج (Mood Stabilizer) ويضم الأدوية التالية Valporal وأحياناً يستعمل Lithium، Halidol، Etomine، Tegretol، التي تهدئه السريعة. هذه الأدوية تعطى في حالة الذهاب (Mania) أو في حالة تقلبات المزاج بين اكتئاب وشعور بالعظمة. يجب الأخذ بالحسبان لدى تناول هذه الأدوية الأعراض الجانبية وبالاخص التسمم بسبب ارتفاع نسبة الدواء في الدم.



أطول في الجسم مثل Assival Vaben, Lorivane . هذه الأدوية تستعمل في أغلب الأحيان كتهيئة بالإضافة للعلاج الأساسي .

- 2- (Deraline) B-Blocker
- 3- SSRI (Buspiron & Nocturno)
- 4- Prothiazine

٦ . أدوية لعلاج الأعراض الجانبية Anticholonergeric

ومنها : (Dekinet Artane) Partan . هذه الأدوية تعطى كمضادات للأعراض الجانبية التي ذكرت عن أدوية علاج الذهان . لكن (Artane) يؤدي إلى الإدمان لذلك نلاحظ استخدامه كثيراً من قبل المدمنين على المخدرات . أما استعمال Dekinet فهو أقل خطورة للإدمان ، وكذلك للتسمم . أكثر العوارض الجانبية لهذه الأدوية تمثل بجفاف في الفم وغشاوة في الرؤيا .

ملخص القول

بالرغم من أن اللغة المستخدمة في هذا الكتيب بعيدة عن تلك المستخدمة بين المرشدين والأشخاص النفسيين ، إلا أنها تؤمّن بأهمية توسيع آفاق المعالجين والمرشدين في جوانب العلاج الطبي النفسي لأنّه جزء لا يتجزأ من عملية العلاج الشاملة . أملين أن يكون هذا الدليل حافزاً للمرشدين والمعالجين للتعاطق في دراسة ومعرفة العلاج الدوائي وعدم التخوف منه .



الدليل البسيط للادوية النفسية

SIMPLE GUIDE
TO PSYCHIATRIC MEDICATIONS



المراكز الفلسطيني للإرشاد
The Palestinian Counseling Center



بيت حنينا، ص. ب ١٧٤٠٢، القدس
تلفون: ٠٢-٦٥٦٢٢٧٢ / ٦٥٦٢٢٧٧
فاكس ٠٢-٦٥٦٢٢٧١
البلدة القديمة، القدس،
تلفاكس: ٠٢-٦٢٧٧٣٦٠

الصفحة الالكترونية: [website: www.pcc-jer.org](http://www.pcc-jer.org) البريد الالكتروني: [E-mail: pcc@palnet.com](mailto:pcc@palnet.com)

